雄花：花萼浅杯状，6 深裂，雄蕊 10 枚，长约 4mm；雌花：单朵或 2 朵聚生于一总苞内，花萼 6 深裂，子房 3 室，花柱通常 3 枚，稀 2 枚；穗状果序长 6—11 厘米，果单生或 3 个聚生于果枝上；坚果球形，稀圆筒形，连刺直径 1.0—2.2cm，壳斗外面刺粗而短，被短柔毛，有时中部以上有 1—3 枚分枝刺，刺仅部分遮蔽壳斗表面。花期 1—2 月；果期 7—9 月。

本种与海南锥 *C. hainanensis* Merr. 近缘。不同在于其叶较小，长 4.5—6.5cm，宽 1.9—3.1cm，顶端渐尖，基部钝或阔楔形，侧脉每边 6—7 条；坚果较小，连刺直径 1—2.2 cm，壳斗刺较粗短，易区别。

本种仅见于文昌东北部低海拔常绿季雨林中。目前海南林科所树木园有少量引种栽培。木材坚硬，可供作建筑、家具和农具。种子可食。

小 银 莲 花 一 新 变 种

A NEW VARIETY OF *ANEMONE EXIGUA* MAXIM.

Key words *Anemone exigua* var. *shanxiensis*

关键词 山西银莲花

山西银莲花 新变种

Anemone exigua Maxim. var. **shanxiensis** B. L. Li et X. Y. Yu, var. nov.

A typo recedit sepalis flavis et papyraceis, carpellis (8—) 10—14 (—18), foliis basalibus semper singularibus.

Shanxi (山西): Lingshi (灵石), Taiyue mountains, Mahe Xiang (马和乡), Hongyandi village (红岩底), alt. 2100m in Betula mixed forest, May 28. 1987, X. Y. Yu (余湘云) 87216 (Typus, SXU*), 87212, 87214, 87215(PE), 87218 (PE); eodem loco, N. H. Li (李腊红) 87211, 87213 (PE), 87217, 87219; J. P. Hao (郝江萍) 87220, 87221。

与小银莲花的区别主要在于萼片黄色，纸质，心皮较多，(8—)10—14(—18)枚；基生叶总是 1 枚，易于区别。

李本良、余湘云 (山西大学生物系，太原)

Li Ben-liang and Yu Xiang-yun (Department of Biology, Shanxi University, Taiyuan)

* SXU——Herbarium of Shanxi University 山西大学植物标本室。